

Arabiska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

نصائح ومعلومات عن الأدوية المهدئة خلال المعالجة عند طبيب الأسنان

قبل المعالجة

من المهم أن يصل إلى علمنا معلومات عن أمراضك المحتمل وجودها والأدوية التي تتناولها. لكي نتمكن من إعطاء الجرعة بصورة صحيحة فمن المهم أيضا أن نعرف وزنك.

يجب أن تعرف الأمور التالية

كيفية عمل ميدازولام Midazolam

- ستسترخي وتشعر بدرجة أقل من القلق أثناء المعالجة.
- الدواء ليس مسكنا للألم وبالتالي فيمكن أن تحصل على التخدير كالمعتاد إذا أردت ذلك.
- عادة ما تكون الذاكرة عن الأشياء التي حصلت خلال المعالجة غير واضحة لأن الدواء يؤثر مؤقتا على القدرة على تذكر الأشياء.

كيف يتم إعطاء ميدازولام

- يتم تناول الدواء في العيادة قبل المعالجة بحدود 20 – 30 دقيقة.
- من المعتاد أن يكون على شكل محلول تشربه.
- في بعض الأحيان يُعطى للأطفال عن طريق قطعة بلاستيكية في فتحة الشرج.

أشياء يجدر بك التفكير فيها قبل المعالجة

من المهم أن تتجنب الأكل أو الشرب قبل الزيارة بساعتين. احرص على الحضور في وقت مناسب قبل موعد الزيارة.

أشياء يجدر بك التفكير فيها بعد المعالجة

يبقى ميدازولام في الجسد طوال اليوم. بعد المعالجة سيتوجب عليك أن تبقى في العيادة لمدة ساعتين. بما أن الدواء يؤدي إلى استرخاء العضلات ويؤثر على التوازن فمن المهم أن تتجنب الأنشطة الجسدية أو الخروج في حركة اليوم في ذلك اليوم. لا يسمح قيادة السيارات قبل مضي 12 ساعة. يجب أن يكون بصحبتك دليل مباشرة بعد المعالجة وأيضا خلال الرحلة إلى المنزل من العيادة.

معلومات لحاملي حق الحضانة

أشياء يجدر بك التفكير فيها خلال المعالجة

بعض الأحيان يحدث أن يصاب الطفل بنوبة غضب أو يشعر بالحزن بالرغم من المداواة وعندها يجب أن تساعد الطفل عن طريق تقديم الدعم والمواساة. من المهم أيضا أن تقدم للطفل صورة إيجابية عن كيفية تسلسل الأحداث لأن هذا هو الشيء الذي سيتذكره الطفل.

أشياء يجدر بك التفكير فيها بعد المعالجة

خلال الرحلة إلى المنزل يجب أن يكون الطفل جالسا كالمعتاد في كرسي الأطفال مع شد حزام الأمان وأيضا أن يجلس شخص بالغ بجانب الطفل. عند الوصول إلى المنزل عامل الطفل بهدوء واحرص على ملاحظة الطفل لأن توازنه يكون متأثرا بفعل المداواة. في حالة هجوع الطفل للنوم فيجب أن يرقد على جانبه.

ما هي تكلفة المعالجة بميدازولام؟

تتطلب هذه المعالجة وقتا إضافيا في العيادة. تقدم هذه المعالجة مجانا للأطفال والشبيبة ضمن إطار رعاية الأسنان المجانية للأطفال والشبيبة. تتم محاسبة الشخص البالغ حسب لائحة الأسعار السارية. في حالة إلغاء الموعد بصورة متأخرة تتم المحاسبة برسم تأخير بقيمة مرتفعة لكل من الأطفال والبالغين.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

Information till vårdnadshavare

Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg.

Att tänka på efter behandling

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.