

BKS - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

## Savjeti i informacije o lijekovima za smirenje prilikom stomatološkog tretmana

U stomatološkoj ordinaciji Folktandvården Västra Götaland se po potrebi uglavnom koristi Midazolam kao lijek za smirenje pred tretman zuba.

### Prije tretmana

Veoma nam je važno da saznamo za vaše eventualne bolesti i lijekove. Kako bismo mogli dati pravilnu dozu, potrebno je da saznamo i koliko ste teški.



### Midazolam – Ovo trebate znati

#### Ovako djeluje Midazolam

- Opustit ćete se i bit ćete manje napeti tokom tretmana.
- Lijek ne djeluje za smanjenje bolova, već ćete dobiti anesteziju kao i obično.
- Lijek utiče na vašu sposobnost da se sjetite čitavog ili dijela tretmana.

#### Ovako se daje Midazolam

- Obično u obliku rastvora koji se pije.
- Djeci se ponekad daje u debelo cijevno pomoću plastične pipete.

#### Mislite o ovome prije tretmana

Kako biste dobili najbolji efekat Midazolama ne smijete jesti kasnije od dva sata prije uzimanja lijeka. Nemojte piti sok od grejpfruta. Sok utiče na efikasnost lijeka. Možete piti vodu. Midazolam se uzima u stomatološkoj ordinaciji 20-30 minuta prije tretmana.

#### Mislite o ovome nakon tretmana

Midazolam ostaje u tijelu tokom čitavog dana. Nakon tretmana možete ostati na klinici sat-dva. Pošto lijek djeluje opuštajuće na mišiće i utiče na ravnotežu, važno je da izbjegavate fizički napor ili da istog dana učestvujete u saobraćaju. Trebate imati nekoga sa sobom ko će vas otpratiti kući sa klinike.

## **Specijalno za djecu**

Budite smireni kod kuće s djetetom ostatak dana i držite dijete pod čvrstom prismotrom pošto lijek utiče na ravnotežu djeteta. Ponekad se dešava da dijete neovisno o lijekovima bude ljuto ili tužno tokom tretmana. Pošto Midazolam utiče na pamćenje, važno je da vi kao pratilac pozitivno govorite o tretmanu kako bi dijete dobilo dobru sliku.

## **Koliko košta tretman Midazolamom?**

Ovaj tretman od klinike zahtjeva dodatne resurse i vrijeme. Za djecu i omladinu do 24 godine tretman je besplatan u okviru Folktandvården Västra Götaland. Odraslima se naplaćuje prema važećem cjeniku. Pri kasnom otkazivanju rezervacije i pri nedolasku, naplaćuje se viša taksa i za djecu i za odrasle.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

## Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inom Folktandvården Västra Götaland används vid behov huvudsakligen Midazolam som lugnande läkemedel inför tandbehandling.

### Inför behandling

Det är mycket viktigt för oss att få veta dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även känna till din vikt.



### Midazolam – Det här behöver du känna till

#### Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och blir mindre ängslig under behandlingen.
- Medicinen har ingen smärtstillande effekt utan du får bedövning som vanligt.
- Medicinen påverkar din förmåga att komma ihåg hela eller delar av behandlingen.

#### Så ges Midazolam

- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

#### Att tänka på före behandling

För att få bästa möjliga effekt av Midazolam ska du inte äta senare än två timmar innan medicineringen. Drick inte grapefruktjuice. Juicen påverkar medicinens effekt. Det går bra att dricka vatten. Midazolam tas på tandvårdskliniken 20-30 minuter före behandlingen.

#### Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen är det viktigt att undvika fysisk ansträngning eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap på väg hem från kliniken.

### **Speciellt för barn**

Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under ordentlig uppsikt eftersom balansen är påverkad. Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset under behandlingen. Eftersom Midazolam påverkar minnet är det viktigt att du som medföljare talar positivt om behandlingen så att barnet får en bra minnesbild.

### **Vad kostar behandlingen med Midazolam?**

Denna behandling kräver extra resurser och tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom Folktandvården Västra Götaland upp till och med 24 års ålder. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.