

BKS - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Savjeti i informacije o lijekovima za umirenje kod stomatoloških zahvata

Prije liječenja

Važno je da su nam poznate vaše eventualne bolesti i lijekovi. Moramo također znati koliko ste teški, kako bi smo mogli dati ispravnu dozu.

Ovo trebate znati

Ovako funkcionira Midazolam

- Tokom zahvata ste opušteni i manje tjeskobni.
- Lijek ne djeluje protiv bolova i zato, ako želite, možete kao i obično dobiti lokalnu anesteziju.
- Sjećanje na zahvat obično poslije nije tako jasno jer lijek privremeno utječe na sposobnost pamćenja.

Ovako se daje Midazolam

- Lijek se uzima u klinici 20–30 minuta prije zahvata.
- Obično u obliku otopine za piće.
- Djeci se ponekad daje putem plastične cijevi u rektum.

Na što treba misliti prije zahvata

Važno je da dva sata prije posjete ne jedete, niti pijete. Mislite na to da na posjet dođete na vrijeme.

Na što treba misliti poslije zahvata

Midazolam se nalazi u tijelu tokom cijeloga dana. Nakon zahvata smijete jedan ili dva sata ostati u klinici. S obzirom da lijek djeluje opuštajuće na mišiće i utječe na ravnotežu, važno je da tokom dana ne sudjelujete u fizičkim aktivnostima ili u saobraćaju. Automobil se smije voziti tek nakon što je prošlo dvanaest sati. Odmah nakon zahvata, ali i kasnije na putu kući iz klinike, morate imati pomoć nekoga, ko vam je u pratnji.

Obavijest starateljima

Na što treba misliti tokom zahvata

Ponekad se dogodi da se dijete iako je primilo lijek, tokom zahvata razljuti ili rastuži i onda vi možete biti od pomoći tako da ga podupirete i smirujete. Važno je da poslije djetetu date pozitivnu sliku razvoja događaja jer je to ono čega će se dijete sjećati.

Na što treba misliti poslije zahvata

Dijete treba, na putu kući u automobilu, kao i obično sjediti u automobilskoj sjedalici za djecu, te pored njega treba sjediti odrasla osoba. Ostatak dana provedite na miran način i pazite na dijete jer lijek utječe na ravnotežu. Ako dijete zaspe onda mora ležati na strani.

Koliko košta liječenje s Midazolamom?

Ovako liječenje zahtjeva dodatno vrijeme na klinici. Ono je besplatno za djecu i mlade u okviru besplatne stomatološke njega za djecu i mlade. Odrasle osobe plaćaju prema važećem cjenovniku. U slučaju kasnog otkazivanja ili nedolaska i djeca i odrasli trebaju platiti veću nadoknadu.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

Information till vårdnadshavare

Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg

Att tänka på efter behandling

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.