

Dari - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

## معلومات و مشوره در رابطه به دواى آرام بخش در وقت تداوى دندان

### قبل از تداوى

برای اینکه بشکل درست به شما دوز دوا داده شود، لازم است که در مورد وزن شما نیز بدانیم و مهم است که ما در رابطه به مریضی و دواهای احتمالی شما احوال داشته باشیم.

### شما باید این را احساس کنید

#### میدازولام چنین کار میکند

- در طول تداوى احساس آرامش و اضطراب کمتر داشته میباشید.
- این دارو مسکن کننده نیست و بنابراین در صورت تمایل می توانید طبق معمول بیهوشی بگیریید.
- بعد از تداوى حافظه انقدر واضح نمی باشد، چون این دوا برای مؤقت بالای حافظه تأثیر میکند.

#### میدازولام چنین داده میشود

- این دوا در کلینیک 20 یا 30 دقیقه قبل از تداوى داده میشود.
- این دوا عموماً بشکل مایع داده میشود.
- بعضی اوقات برای اطفال بواسطه پایپ پلاستیکی از طریق مقعد داده میشود.

### متوجه شدن این نقاط قبل از تداوى

مهم است که شما دو ساعت قبل از تداوى خوردن یا نوشیدن را متوقف کنید. متوجه باشید که در وقت معین حاضر شوید.

### متوجه شدن این نقاط بعد از تداوى

دواى میدازولام برای تمام روز در وجود باقی میماند. بعد از تداوى شما تا به یک الی دو ساعت در کلینیک باقی میمانید. بخاطریکه این مواد مسکن کننده عضلات بوده پس توازن را متأثر میکند، بنابراین مهم است که همان روز در کدام فعالیت فیزیکی سهم گرفته نشود و همچنین چیزی رانده نشود. برای دوازده ساعت اجازه موتو رانندن را ندارید. بعد از تداوى بلافاصله باید با شما و نیز در وقت رفتن از کلینیک به خانه کسی با شما موجود باشد.

## معلومات برای سرپرست

### برای فکر کردن در جریان تداوى

بعضی اوقات با وجود گرفتن دوا، طفل عصبانی و خفه می شود، پس درین حالت شما میتوانید که آنها را کمک و آرام کنید. مهم است که شما به طفل در رابطه به اجرای تداوى یک تصویر مثبت نقش کنید چون کودک بعداً همان تصویر را در حافظه خود حفظ میکند.

### **متوجه شدن به امور بعد از تداوی**

طفل در سفر بطرف خانه باید بطور عادی در چوکی اطفال نشسته و بند حفاظتی را بسته کند و در ضمن یک بزرگسال باید در پهلوی آن نشسته باشد. بعداً تمام همان روز را در خانه با طفل بطور آرام سپری کنید و متوجه طفل باشید چون موازنه او متأثر میباشد. اگر طفل میخواهد که بخوابد، باید یکطرفه خواب کند.

### **تداوی با میدانزولام چقدر مصرف دارد؟**

این نوع تداوی در کلینیک نیاز به وقت اضافی دارد. این تداوی برای اطفال رایگان میباشد و در چهار چوب رایگان بودن اطفال و مراقبت دندان جوانان به جوانان و بزرگسالان رایگان میباشد. مصارف تداوی بزرگسالان طبق لست قیمت مربوطه میباشد. در صورت لغوه نموده وقت با تأخیر و عدم حضوری، از کودکان و بزرگسالان فیس بیشتر گرفته میشود.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

## Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

### Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

### Det här behöver du känna till

#### Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

#### Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

#### Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

#### Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

### Information till vårdnadshavare

#### Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg.

**Att tänka på efter behandling**

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

**Vad kostar behandlingen med Midazolam?**

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.