

Engelska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Advice and information about sedatives during dental treatments

Before the treatment

It is important for us to know if you have any illnesses or take any medications. We also need to know your weight so that we may give the correct dosage.

This is what you need to know

How Midazolam works

- You will feel relaxed and less anxious during the treatment.
- The medication is not a pain reliever, which is why you may receive anesthesia if you want it.
- Your memory of the treatment is usually a bit unclear afterwards, as the medication temporarily affects your memory.

How Midazolam is given

- The medication is taken at the clinic 20–30 minutes before the treatment.
- It is usually taken as a drinkable solution.
- Children may sometimes receive it through a pipette in the rectum.

Things to consider before the treatment

It is important that you do not eat or drink two hours before the visit. Remember to arrive in time for your visit.

Things to consider after the treatment

Midazolam remains in your body for the entire day. You will stay at the clinic for one to two hours after the treatment. The medication relaxes the muscles and affects the balance, which is why it is important that you do not do any physical activities or drive in traffic on the same day. Driving is forbidden until twelve hours after the treatment. You need to have a person accompanying you immediately after the treatment, and also later when you return home from the clinic.

Information for guardian(s)

Things to consider during the treatment

Children may sometimes become angry or sad despite the medication, in this case you can help them by being supportive and calming them. It is important that you give them a positive impression of the process as this is what the child will remember.

Things to consider after the treatment

If you are returning home in a car, the child needs to sit as usual in their car seat with a seatbelt, next to an adult. Take it easy with the child for the rest of the day and pay attention to them as their balance is affected. The child needs to be laid on their side if they fall asleep.

What does the treatment with Midazolam cost?

This treatment requires additional time at the clinic. It is free for children and young adults as part of the free dental care for children and adolescents. Adults will be charged according to the current price list. Late cancellations and no-shows will be charged a higher fee for both children and adults.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

Information till vårdnadshavare

Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg.

Att tänka på efter behandling

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.