

Mandarin (Förenklade tecken) - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

## 有關在牙科治療所使用的鎮靜藥物的建議和信息

在西約特蘭郡 VästraGötaland 的公共牙科護理內，在有需要使用鎮靜藥物時，咪達唑仑 Midazolam 是主要用作的鎮靜劑。

### 接受治療前

對我們來說，了解您可能有的疾病和服用的藥物是非常重要的。為了得到正確的劑量，我們還需要知道您的體重。



### 咪達唑仑 Midazolam – 這些是您需要知道的

#### 咪達唑仑 Midazolam 的作用

- 在治療過程中，您可以放鬆並減輕焦慮。
- 該藥物沒有鎮痛作用，而你會如常接受麻醉藥治療。
- 該藥物會影響您對該治療的全部或部分的記憶能力。

#### 咪達唑仑 Midazolam 的給予方法

- 通常以溶液的形式飲用。
- 對兒童，有時是在直腸通過一個塑料壺嘴將藥物送入。

#### 接受治療前要考慮的東西

為了獲得接受了咪達唑仑 Midazolam 后的最佳效果，您在服藥前最起碼有兩個小時不得進食。不要喝葡萄柚汁，果汁影響藥物的功效。可以喝水。咪達唑仑 Midazolam 是在牙科診所接受治療的 20-30 分鐘前服用。

#### 接受治療后要考慮的東西

咪達唑仑 Midazolam 會存在體內一整天。治療后，您可以逗留在診所一至兩個小時。由於該藥物有放鬆肌肉的功效並會影響身體平衡，因此避免作消耗體力的活動或在同一天出門在外是很重要的。超過十二個小時后才允許駕駛。您應該在診所回家的路上有人作伴。

## 對兒童要特別注意

在當天的余下时间里，在家中與孩子放轻松點，因為孩子的身體平衡受到影响，因此要對孩子作适当的監督。有时，尽管使用了药物，孩子在治疗过程中会变得生气或悲伤。由于咪达唑仑 Midazolam 会影响记忆力，當您陪伴孩子去接受治療時，說些關於治療的好處，這是很重要的，以使孩子获得一個良好的记忆。

## 咪达唑仑 Midazolam 的治疗费用是多少？

这种治疗在诊所需要额外的资源和时间。凡在西約特蘭郡 Västra Götaland 居住和接受公共牙科護理的 24 岁以下的儿童和成人是免费的。成人根据適應的价格表收费。如果延迟取消預約和在預約時間不露面，不論儿童和成人均需支付更高的费用。

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

## Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inom Folktandvården Västra Götaland används vid behov huvudsakligen Midazolam som lugnande läkemedel inför tandbehandling.

### Inför behandling

Det är mycket viktigt för oss att få veta dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även känna till din vikt.

### Midazolam – Det här behöver du känna till

#### Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och blir mindre ängslig under behandlingen.
- Medicinen har ingen smärtstillande effekt utan du får bedövning som vanligt.
- Medicinen påverkar din förmåga att komma ihåg hela eller delar av behandlingen.

#### Så ges Midazolam

- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

#### Att tänka på före behandling

För att få bästa möjliga effekt av Midazolam ska du inte äta senare än två timmar innan medicineringen. Drick inte grapefruktjuice. Juicen påverkar medicinens effekt. Det går bra att dricka vatten. Midazolam tas på tandvårdskliniken 20-30 minuter före behandlingen.

#### Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen är det viktigt att undvika fysisk ansträngning eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap på väg hem från kliniken.



### **Speciellt för barn**

Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under ordentlig uppsikt eftersom balansen är påverkad. Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset under behandlingen. Eftersom Midazolam påverkar minnet är det viktigt att du som medföljare talar positivt om behandlingen så att barnet får en bra minnesbild.

### **Vad kostar behandlingen med Midazolam?**

Denna behandling kräver extra resurser och tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom Folktandvården Västra Götaland upp till och med 24 års ålder. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.