

Persiska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

اطلاعات و راهنمایی در مورد داروی آرامبخش هنگام درمان دندانپزشکی

در خدمات دندانپزشکی ناحیه وستراپوتالند در صورت نیاز عمدتاً از میدازولام بعنوان داروی آرامبخش قبل از درمان دندانپزشکی استفاده می شود.

قبل از درمان

برای ما بسیار اهمیت دارد که از بیماریها و داروهای احتمالی شما کسب اطلاع کنیم. برای تعیین مقدار صحیح دارو بایستی وزن شما را بدانیم.



مطالبی که لازم است در مورد میدازولام بدانید

تأثیر میدازولام به شرح زیر است

- شما آرام می شوید و ترس شما طی درمان کمتر می شود.
- این دارو اثر تسکینی ندارد از اینرو طبق معمول به شما ماده بیحسی زده می شود.
- این دارو باعث می شود تمام یا بخشی از درمان را بخاطر نیاورید.

شیوه مصرف میدازولام

- معمولاً بصورت یک مایع خوراکی داده می شود.
- گاهی اوقات برای کودکان بصورت یک شیاف پلاستیکی در مقعد داده می شود.

مواردی که بایستی قبل از درمان بخاطر داشته باشید

برای آنکه میدازولام بهترین تأثیر را داشته باشد شما بایستی حداقل دو ساعت قبل از مصرف دارو چیزی نخورید. آب گرم فروت ننوشید، چون روی تأثیر دارو را کم می کند. نوشیدن آب مانعی ندارد. میدازولام 20 تا 30 دقیقه قبل از درمان در مطب دندانپزشکی داده می شود.

مواردی که بایستی پس از درمان بخاطر داشته باشید

میدازولام برای تمام روز در بدن شما باقی می ماند. شما بایستی پس از درمان یک تا دو ساعت در کلینیک بمانید. چون این دارو تأثیر آرامبخش دارد و ماهیچه ها را شل کرده و روی تعادل بدن تأثیر می گذارد مهم است که همانروز از فعالیت جسمی یا رفت و آمد در ترافیک خودداری شود. رانندگی تا دوازده ساعت پس از درمان ممنوع است. هنگام رفتن از کلینیک به خانه بایستی یکنفر همراه داشته باشید.

موارد ویژه مربوط به کودکان

باقیمانده روز را با کودک در خانه به آرامی بگذرانید و کودک را کاملاً زیر نظر خود داشت هباشید چون تعادل بدن او خوب نیست. گاهی اوقات ممکن است کودک با اینکه دارو مصرف کرده طی درمان عصبانی و ناراحت باشد. از آنجا که میدازولام روی حافظه تأثیر می گذارد مهم است شما که همراه کودک هستید درمان را با جملات مثبت تعریف کنید تا کودک خاطره خوبی از درمان کسب کند.

هزینه مصرف میدازولام چقدر است؟

درمان با این دارو مستلزم منابع انسانی و صرف وقت بیشتری در کلینیک است. دادن این دارو در کلینیکهای دندانپزشکی وسترایوتالند به کودکان و نوجوانان تا سن 24 سالگی مجانی است. از بزرگسالان مطابق فهرست نرخهای جاری هزینه اخذ می شود. از کودکان و بزرگسالان در صورت عدم حضور در وقت تعیین شده یا لغو دیر هنگام وقت، هزینه بالاتری اخذ میگردد.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inom Folktandvården Västra Götaland används vid behov huvudsakligen Midazolam som lugnande läkemedel inför tandbehandling.

Inför behandling

Det är mycket viktigt för oss att få veta dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även känna till din vikt.

Midazolam – Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och blir mindre ängslig under behandlingen.
- Medicinen har ingen smärtstillande effekt utan du får bedövning som vanligt.
- Medicinen påverkar din förmåga att komma ihåg hela eller delar av behandlingen.

Så ges Midazolam

- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

För att få bästa möjliga effekt av Midazolam ska du inte äta senare än två timmar innan medicineringen. Drick inte grapefruktjuice. Juicen påverkar medicinens effekt. Det går bra att dricka vatten. Midazolam tas på tandvårdskliniken 20-30 minuter före behandlingen.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen är det viktigt att undvika fysisk ansträngning eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap på väg hem från kliniken.



Speciellt för barn

Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under ordentlig uppsikt eftersom balansen är påverkad. Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset under behandlingen. Eftersom Midazolam påverkar minnet är det viktigt att du som medföljare talar positivt om behandlingen så att barnet får en bra minnesbild.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra resurser och tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom Folktandvården Västra Götaland upp till och med 24 års ålder. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.