

Polska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Rady i informacje o lekach uspokajających przy zabiegach stomatologicznych

Przed zabiegiem

Ważne jest żebyśmy wiedzieli o Twoich ewentualnych chorobach i zażywanych lekach. Aby dobrać odpowiednią dawkę leku musimy również wiedzieć, ile ważysz.

To powinieneś wiedzieć

Tak działa Midazolam

- Rozluźniasz się i odczuwasz mniejszy niepokój w czasie zabiegu.
- Lek nie ma działania przeciwbólowego i dlatego możesz dostać standardowe znieczulenie, jeśli tego chcesz.
- Pamięć z przebiegu wizyty jest niewyraźna, ponieważ lek wpływa krótkotrwale na zdolność zapamiętywania.

Tak podaje się Midazolam

- Lek zażywa się w klinice na 20–30 minut przed zabiegiem.
- Najczęściej doustnie w postaci płynnej.
- Dzieciom podaje się czasem lek do pupy przy pomocy plastikowej pipetki.

O czym pamiętać przed zabiegiem?

Nie jedz i nie pij na 2 godziny przed wizytą. Pamiętaj, aby przyjść na wizytę z zapasem czasu.

O czym pamiętać po zabiegu?

Midazolam pozostaje w organizmie przez cały dzień. Po zabiegu musisz odczekać w klinice godzinę do dwóch. Ponieważ lek wpływa rozluźniająco na mięśnie i oddziałuje na równowagę, ważne jest, aby nie uczestniczyć w tym dniu w zajęciach fizycznych i nie prowadzić samochodu. Prowadzenie samochodu jest dozwolone najwcześniej po 12 godzinach. Musisz też mieć osobę towarzyszącą zaraz po zabiegu, jak również w drodze powrotnej z kliniki do domu.

Informacja dla rodziców lub opiekunów dziecka

O czym pamiętać w czasie zabiegu?

Czasami zdarza się, że dziecko mimo podania leku jest pobudzone lub smutne i możesz wtedy pomóc wspierając i uspokajając dziecko. Ważne abyś stworzył u dziecka pozytywne odczucia przebiegu wizyty, ponieważ to właśnie pozostanie w pamięci dziecka.

O czym pamiętać po zabiegu?

W czasie powrotu do domu samochodem, dziecko ma siedzieć jak zawsze w foteliku samochodowym przypięte pasami, a obok dziecka powinna siedzieć osoba dorosła. Zwolnij tempo w domu i miej dziecko na oku przez cały dzień, ponieważ równowaga może być zaburzona. Jeśli dziecko uśnie, ma spać na boku.

Ile kosztuje podanie Midazolamu?

Ten zabieg wymaga więcej czasu w klinice. Jest bezpłatny dla dzieci i młodzieży w ramach bezpłatnych usług stomatologicznych. Dorośli płacą zgodnie z aktualną taryfą. W razie późnego odmówienia lub nieprzyjścia na wizytę będzie nałożona podwyższona opłata zarówno w stosunku do dzieci jak i dorosłych.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därfor kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilköring är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

Information till vårdnadshavare

Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg.

Att tänka på efter behandling

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.