

Sorani - Råd till dig som tagit bort en tand

رینمایی بو تو که ددانیکت دهر هیناوه

بیر لهمانه بکهروهه

ووریابه گاز له زمان یان گووپی نهگریت کاتیک که بهنج کر اویت.

کهی دهتوانم دهستبکه مهوه به خواردن و خواردنهوه؟

پاش دهر هینانی ددانهکه توپلایک خوینی مهیو بو پاراستنی برینهکه لهسهه ئه شوینه دروست دهبیت که ددانهکهی تیدا بووه. بو ئهوهی برینهکه شانسی ساریژبوونهوهی به باشی ههبتیت، دهشتیت ناو له ناودهمت وهر نهدهبیت، خواردن نهخویت، ههچ نهخویتهوه یان جگهره نهکشیت تا بهنجکه بهری دههات. لانی کهم دوو کاژیر چاومروانکه. رۆژی یهکهه شلهمهنی یان خواردمههنی نهرم بخو بو ئهوهی عمزیهتی برینهکه نههات.

راهینان

رۆژی یهکهه خۆت له راهینانی جهستهیی بهدوور بگره. گهر تو خۆت زور برهتینی مهترسی ئهوه دپته کایهوه برینهکه خوینی لنبیت.

تووتن

چههه کاژیریک پاش نهشتهه گهر یهکهه خۆت له جگهر مکیشان یان سنوس بهدوورگره، ئهوانه ساریژبوون خراپتر دهکن.

خوینبهربوون

شتیکی ئاساییه برینهکه شهووررۆژی یهکهه کهمیک خوینی لنبیت. ئهگهر خوینهکهی نهگیرسایهوه یان سهلهنووی خوینی لنبیتهوه، دهتوانیت دهستهسریک یان سالغیهک بهخپته سهه شوینی خوین لپهاتنهکه وه بو ماوهی ۳۰ خولهک ددانی پيدا بنییت. پاشان بزانه ئایا خوینهکهی وهستاومهوه. ئهگهر هینشتا ههری خوینی لنبیت، دهستهسریک یان سالغیهکی نوئی بهخه سههه سهری و بو ماوهی ۱۵ خولهکی تر ددانی پيدا بنی. ئهگهر پاش ۴-۵ ههولدان خوینهکهی نهگیرسایهوه، پهپومندی به بنکهی چاودیری ددانی میلییهوه بکه بو وهرگرنتی ئاموژگاری. کاتیکیش خوینی لپهات، ئیدی ئاوی تیوهرمهده.

ئاوسان و پهلهی شین

ئاوسانی دهموپل و چههه بهشیکی دهموچاوه پاش نهشتهه گهر یهکهه شتیکی ئاساییه. گهرهترین ئاوسان بهزوری ۲-۳ رۆژ پاش ئهوه روودات. کاتیک ئاوساویهکه نیشتهوه، شینبوونهوه پهیدا دهبیت، که ئهههش پاش چههه ههفتهیهک دیار نامینیت.

تهقهل

ههندیک جار پیویست دهکات برینهکه به داو بدرورتیهوه که پیویسته پاش ۷-۱۰ رۆژیک له لایهن کارمهاندانی چاودیری ددانهوه دهرهینریت. جا لهوانهیه کاتیکی سهردانهوهت بو دانریت. له ههندیک حالهتی تر دا جوره داویک بهکاردههینریت که له خویمهوه دیار نامینیت.

خاوین راگرنتی ناو دهه

گرنگه له میانهی ساریژبوونی برینهکهدا به شیوهیهکی دروست ناوهم پاکوخاوین راگیریت. وهک راهاتوویت ددانهکانت به فلچه بشو بهلام له رۆژهکانی یهکههه فلچه له دهروریهی برینهکه مهده. شلهمهنی دژبهکتريا له ناودهمت وهرده (بو نمونه کورسودیل Corsodyl، هیکسیدیت Hexident، پاروئیکس Paroex) ئهگهر دکتوری ددانهکهت رینمایی ئهوه بکات.

نازار و تالیهاتن

رهنگه کاتیک بهنجهکه بهریدا نازار دروست بیت، دهمکردنموه و جوین زحممت بیت. ئەمەش ئاساییه. رهنگه پاش نهشتهگره ی گهورهتر مرۆف تاشی لئینیت. له باری ئاساییدا پاش دوو رۆژیک ناخۆشیهکان نامینن. ئەگەر تو پتویست بکات حەبی نازار شکین بهکار بهینیت، رینماییت دهکەین کەلک له ئەلقیدۆن / پانۆدیل وەرگریت به پنی ئەو ئەندازمیهی لەسەر پاکهتهکهی نوسراوه. خۆت بهدوور بگره لهو حەبانە ی ترشی ئەسیتیل سالیسیلیکی تێدایه بۆ نمونه تریو، ماگنئیسیل، چەندین جۆری تر چونکه ترشی ئەسیتیل سالیسیلیک مەترسی خۆننەبربوون زیاد دهکات. ئەگەر هیشتا هەر نازار هکه بهری نەدا، پهيوهندی به کینیکهکهتوه بکه.

پرسیار

همیشه بهخیر هاتنت لێدهکەین پهيوهندی به ئیموه بکهیت له بنکهی چاودێری ددانی میلی ئەگەر پرسیات لەسەر شتیک ههبوو. به پلهی یهکهم پهيوهندی بهو کلینیکهوه بکه که نهشتهگر یهکهی ئەنجامداوه.

ئەگەر کلینیکهکه داخرا بوو

پهيوهندی به مهلبەندی رینماییدانی نهخۆشهوه بکه به ژماره تەلەفۆنی ۱۱۷۷ .

Svenska - Råd till dig som tagit bort en tand

Råd till dig som har tagit bort en tand

Att tänka på

Var försiktig så att du inte biter dig i tungan eller kinden när du är bedövad.

När kan jag äta eller dricka?

Efter att tanden har tagits bort bildas en propp med levrat blod för att skydda såret där tanden har suttit. Om såret ska ha en chans att läka bra bör du inte skölja munnen, äta, dricka eller röka innan bedövningen har släppt. Vänta minst två timmar. Välj flytande eller halvfast föda det första dygnet för att inte irritera såret.

Träning

Undvik fysisk träning det första dygnet. Om du anstränger dig hårt finns det risk att såret börjar blöda.

Tobak

Undvik att röka eller snusa de närmaste timmarna efter ingreppet, detta försämrar läkningen.

Blödning

Det är vanligt att såret blöder lite under det första dygnet. Om det inte slutar att blöda eller om det börjar att blöda på nytt kan du lägga en ren näsduk eller kompress över det blödande såret och bita ihop i minst 30 minuter. Kontrollera därefter att det har slutat att blöda. Om blödningen fortfarande inte har upphört, lägg på en ny näsduk eller kompress och bit ihop i ytterligare 15 minuter. Har såret inte slutat att blöda efter 4-5 försök, kontakta Folktandvården för råd. Skölj inte med vatten när det blöder.

Svullnad och blåmärken

Att munnen och delar av ansiktet svullnar upp efter ingreppet är normalt. Svullnaden brukar vara som störst efter 2-3 dagar. När den lägger sig igen kan det uppstå blåmärken, dessa försvinner normalt efter någon vecka.

Stygn

Ibland behöver såret sys ihop med en tråd som behöver tas bort av tandvårdspersonal efter 7-10 dagar. Då har du troligen fått en återbesökstid. Vid andra tillfällen används en tråd som försvinner av sig själv.

Munhygien

Under sår-läkningen är det viktigt att munhygien sköts på rätt sätt. Borsta tänderna som vanligt men undvik att röra sårområdet de första dagarna. Skölj munnen med en antibakteriell lösning (till exempel Corsodyl, Hexident, Paroex) om din tandläkare har rekommenderat det.

Värk och feber

När bedövningen har släppt kan det göra ont och vara svårt att gapa och tugga. Detta är normalt. Efter större ingrepp kan du även få feber. Besvären brukar gå över efter ett par dagar. Om du måste ta värktabletter rekommenderar vi Alvedon/Panodil enligt doseringsanvisning på förpackningen. Undvik tabletter med acetylsalicylsyra till exempel Treo, Magnecyl med flera då acetylsalicylsyra ökar blödningsrisken. Går smärtan inte över, kontakta din klinik.

Frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Folktandvården om du undrar över något. Kontakta i första hand den klinik som utförde ingreppet.

När kliniken är stängd

Ring sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.