

Sorani - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

رینمایی و زانیاری دهربارهی دهرمانی هیورکهرهوه له کاتی چارهسه رکردنی پزیشکی دداندا

له مهلبندی چاودیری ددانی میلیدا (Folktandvården) له ههیمی خورناوای یوتهلاندا (Västra Götaland) له کاتی پیوستدا به پلهی سههکی میدازولام (Midazolam) وهک دهرمانی هیورکهرهوه بهکاردههیریت له کاتی چارهسه رکردنی پزیشکی دداندا.

له کاتی چارهسه رکردندا

بۆ ئیمه زور گرنه بزانین نهو نهخوشیانه چین که رهنگه ههتین و دهرمانهکانت چین. بۆ نهوهی بتوانین به نهاندازی دروست دهرمانهکعت بدیهینی، تهانهت دهیت بشزانین کینشت چهنده.



میدازولام Midazolam - پیوسته ناگات لهم شتانه بیت

ئاوهها میدازولام کاردهکات

- لهکاتی چارهسه رکردنهکهدا ئارامت دهکاتهوه و کهمتر ههست به ترس دهکیت.
- دهرمانهکه هیچ کاریگهری لهسهه شکاندنی نازار ناگات بهکو ههه وهک باری ناسایی بهنج دهکرییت.
- دهرمانهکه کاریگهری له توانات دهکات که رهنگه هههوه چارهسه ریهکه یان بهشیکیت بیرکهرهوه.

میدازولام بهم شیوهیه دهریت

- له باری ناساییدا بهشیوهی شلهههیه و دهخوریتوه.
- ههندیک جار به بۆریهکی پلاستیکی له کومهوه دهریت به مندالان.

بهر له چارهسه رکردن بیر لههه بکهرهوه

بۆ نهوهی به باشترین شیوه میدازولام کاریگهری خوی بکات، وا چاکه دوو کارژیر پیش وهگرتنی دهرمانهکه ههچت نهخواردیت. شهههتی گراپی میوه مهخورهوه. شهههت کار له کاریگهری دهرمانهکه دهکات. بهلام دهوانیت ناو بخویتوه. دهرمانی میدوزولامت له مهلبندی ددانچاگردنهکه 20-30 خولهک پیش چارهسه ریهکه دهریت.

پاش چارهسه رکردن بیر لههه بکهرهوه

هههوه رۆژهکه میدازولام له ههشدا دههینتهوه. پاش چارهسه رکردنهکه یهک تا دوو کاتژمیر له مهلبندهکه دههینتهوه. چونکی دهرمانهکه کاریگهری لهسهه خاوردنهوهی ماسولکهکان ههیه و کار له هاوتایی لهش دهکات، گرنه خوت له رهاندنی جهستهی بهدور بگریت یان ههههه رۆژ له ترافیکدا نههیت. ئوتومیل لئخورین ریگه پینههراوه تا دوانزه کارژیر تینههیریت. دهشیت تو له مهلبندهکهوه بۆ مالهوه کهسکت لهگهلا بیت.

به تاييهت بۆ مندالان

باقي رۆژمهكه به نارامى ههسوكهوت لهگهڵ مندالهكه بكه و ببخهره ژير چاوديريهوه چونكى دهرمانهكه كاريگهرى له هاوتايى لهشى كردووه. ههندىك جار روودهدات مندالهكه لهگهڵ نهوهشدا دهرمانى وهرگرتووه، هيشتا له كاتى چارهسهركرندا تووره يان بيتاقهت دهبيت. چونكى ميدازۆلام كاريگهرى له بير دهكات گرنگه تۆ لهگهڵ مندالهكهدا بيت و به شيوهيهكى ئهرينى باسى چارهسهرى بۆ بكهيت بۆ ئهوهى مندالهكه وئيهيهكى باش بهدهست بهيئيت.

چارهسهركردن به ميدازۆلام چهندى تيدهچيت؟

ئهم جۆره چارهسهرى له مهلبهندهكه پيوستى به كات و سهرچاويهكى زياتر دهبيت. بۆ مندالان و گهنجاني گهوره سال له مهلبهندهكاني چاوديرى دداني ميليى له ههرئيمى خوريناواى يوتهلاندا تا 24 سا ليش به خورايى يه. بۆ گهوران به پيى ليستهيهك پارمىان ليوهردهگيرت. نهگهر درنگ كاتهكه بگهرينيموه يان له كاتى ديارىكرادا ناماده نهبيت ميرانهيهكى بهرزترت بۆ مندالان ههروهها بۆ گهورانيش ليوهردهگيرت.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inom Folktandvården Västra Götaland används vid behov huvudsakligen Midazolam som lugnande läkemedel inför tandbehandling.

Inför behandling

Det är mycket viktigt för oss att få veta dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även känna till din vikt.

Midazolam – Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och blir mindre ängslig under behandlingen.
- Medicinen har ingen smärtstillande effekt utan du får bedövning som vanligt.
- Medicinen påverkar din förmåga att komma ihåg hela eller delar av behandlingen.

Så ges Midazolam

- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

För att få bästa möjliga effekt av Midazolam ska du inte äta senare än två timmar innan medicineringen. Drick inte grapefruktjuice. Juicen påverkar medicinens effekt. Det går bra att dricka vatten. Midazolam tas på tandvårdskliniken 20-30 minuter före behandlingen.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen är det viktigt att undvika fysisk ansträngning eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap på väg hem från kliniken.



Speciellt för barn

Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under ordentlig uppsikt eftersom balansen är påverkad. Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset under behandlingen. Eftersom Midazolam påverkar minnet är det viktigt att du som medföljare talar positivt om behandlingen så att barnet får en bra minnesbild.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra resurser och tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom Folktandvården Västra Götaland upp till och med 24 års ålder. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.