

Sorani - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

زانبارى و نامۆزگارى دهربارهى دهرمانى هئورکردنهوه له حالهتى ددانچاککردندا

پيش چارهسهرکردن

گرنگه ئيمه ئاگامان لهو نهخوشى و دهرمانانه ههبيت كه رهنگه ههتين. بۆ ئهوهى بتوانين ئهنازاهى دروستت بدهينى، تهناهت بئويستمان بهوش دهبيت بزائين كيشت چهنده.

بئويست دهكات ئاگادارى ئهم شتانه بيت

ميدازولام Midazolam بهم شيوهيه كار دهكات

- خاوت دهكاتوه و له ميانهه چارهسهرکردنهكهدا كهمنتر نيگهران دهبيت.
- دهرمانهكه ئازار شكين نيه، بۆيه دهتوانيت ههه وهك بارى ئاسايى ئهگهر ويستت، بهنج وهرگريت.
- له بارى ئاساييدا شت بيركهوتنهوه پاش چارهسهريهكه هينده روون نيه چونكه دهرمانهكه به شيوهيهكى كاتيبى كارىگهري له تواناي بيركهوتنهوه دهكات.

ميدازولام بهم شيوهيه دهرت

- دهرمانهكه نزيكهه ۲۰-۳۰ خولهك بهه له چارهسهريهكه له كلينيكهكه وهردهگيرت.
- له بارى ئاساييدا به شيوهه گيراوويهك دهخورتتهوه.
- ههنديك جار له ريگاي بوريهكى پلاستيكيهوه له كومهوه دهرت به مندال.

پيش چارهسهريهكه بير لهمانه بكهروهه

گرنگه دوو كاژير پيش ديدنهيهكه هيجت نهخوارديت و نه خوارديتهوه. له يادت نهچيت له كاتيبى گوجاودا ببيت بۆ سهردانهكه.

پاش چارهسهريهكه بير لهمانه بكهروهه

ميدازولام له ميانهه روژكهدا له جهستهدا دهمنيتتهوه. پاش چارهسهريهكه بۆت ههيه يهك دوو كاژير له كلينيكهكه بمينيتتهوه. لهبهه ئهوهى دهرمانهكه ماسولهكه هئور دهكاتوه و كارىگهري له هاوسهنگى لهش دهكات گرنگه ههمان روژ بهشدارى له چالاكيه جهستهيهكاندا نهكهبيت يان خۆت نهخهيهته ناو ترافيكهوه. لئخوريى ئوتومبيل بهه له تيبهريى دوانزه كاژير ريگا پينهراوه. دهشيت تو يهكسهه دواى وهرگرتنى چارهسهريهكه چاوساغيتك لهگهلا ببيت و تهناهت پاش ئهوش كه له كلينيكهكهوه دهگهرتتهوه بۆ مالهوه.

زانبارى بۆ سهههريشتياران

له ميانهه چارهسهريهكهدا بير لهمانه بكهروهه

ههنديك جار روودهدات لهگهلا ئهوهشدا مندالهكه دهرمانى دراوتهى، كهچى ههه توره يان بيتاهته، جا دهتوانيت لهو كاتهدا يارمهتى و پشتگيرى بدهيتى بۆ ئهوهى هئوربيتتهوه. پاشان گرنگه توش وينهيهكى پوزمئيفى لهسهه رووداومهك پى بهخشيت، ئهههش دهبيتته هوى ئهوهى مندالهكه شتهكانى بيركهوتتهوه.

پاش چاره سهریه که بیر له مانه بکهره وه

دهشیت له کاتی چوونه وه بۆ ماله وه دا منداله که وهک حاله تی ناسایی له کورسی نوتومبیلدا دانیشیت و قایشی سه لامه تی بیه ستیت ههروه ها که سیکه گه ره شی لاوه دانیشیت. باقی رۆژ که هه ولده له ماله وه له گه ل منداله که تا نارام بیت و منداله که بخره ژیر چاودیره وه چونکه چاره سهریه که کار یگه ری له هاوسهنگی منداله که کردوه.

چاره سهر کردن به میدازۆلام چهندی تی دهچیت؟

ئه م چاره سهریه له کلینیکه که دا پتویستی به کاتیکی زیاتر ههیه. بۆ مندالان و لاوان به خۆرایه یه له نئو چوار چیه وه ی ئه و چاودیره تهندروسته یه بی بهرامبه رانه ی بۆ مندالان و لاوان دانراون. نه گه ر مروف له حاله تیکدا درهنگ کات دانته وه یان نه چیت بۆ سه ر دانه که، ئه و میرانه یه کی زیاتر ده سه نریت هه م بۆ مندال و هه م بۆ گه ره ش.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

Information till vårdnadshavare

Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg.

Att tänka på efter behandling

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.