

Språk - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ምክርን ሓበሬታን ብዛዕባ መድሃኒት መዐገሲ ቃንዛ ኣብ እዋን ሕክምና ስኒ

ቅድመ ሕክምና

ብዛዕባ ዘለውኻ እዋናውያን ሕጻናት ይኹን እትወስዶም መድሃኒታት ክንፍልጥ ብጠዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ክዋሃብካ ዘለዎ ቅኑዕ ዓቀን መድሃኒት ክንፈልጥ መታን ግድን ክብደትካውን ክንፈልጥ ኣሎና።

እዚ ካብቲ ክትፈልጡ ዘለካ ነገር እዩ

ሚዳዘላም (Midazolam) ሽምዚ እዩ ዝሰረሕ

- ኣብ እዋን ሕክምና ፍኹስ ክብለካ እዩ፡ ከምኡውን ውሑድ ጭንቀት ጥራይ እዩ ክስማዓካ።
- እዚ መድሃኒት መዐገሲ ቃንዛ ኣይኮነን፡ ስለዚ ንምድንዛዝ ስለዝጠቅም ከምዝኾነ ልሙድ ጌርካ ውሰዶ።
- እዚ መድሃኒት ኣብ ጊዜ ሕክምና ዝትግበረ ክትዝክር ዘጸግም እዩ፡ ስለዝኾነ እዚ መድሃኒት ጊዚያዊ ዝኸርካ ክጸሉ ይኸእል እዩ።

ሚዳዘላም (Midazolam) ብሽምዚ ይዋሃብ

- እዚ መድሃኒት ቅድሚ ሕክምና 20–30 ደቃይቅ ኣብ ክሊኒክ ስፔሻል ይዋሃብ
- መብዛሕኡ ጊዜ ፈሰሲ ንምስታይ ከም መፍትሒ ይኸውን
- ሓደ ሓደ ጊዜ ንቆልዑ ብጥላስቲክ ዝተሰርሐ ቱቦ ጌርካ ብመሃንቱሶም ይዋሃብ

ቅድሚ ሕክምና ምጅማር ክትሓስቦም ዘሎካ

ኣብዚ ክትሓስቦ ዘሎካ ቅድሚ ናብ ሕክምና ምምጻእካ 2 ሰዓት ክትበልዕ ወይ ክትስቲ ዩብልካን። ኣብ ሰዓትካ ክትመጽእ ክምዘሎካ ክትፈልጥ ኣሎካ።

ድሕሪ ሕክምና ክትሓስቦ ዘሎካ።

መድሃኒት ሚዳዘላም ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ሰውነትካ ኣሎ። ድሕሪ ሕክምና ን1 ወይ 2 ሰዓታት ኣብቲ ክሊኒክ ክትጸንሕ ኣሎካ። ምክንያቱ እዚ መድሃኒት ንጭዋዳታት ምዝልፍላፍን ሚዛንካ ክዘናብል ስለዝኸእልን ካብ ኣካላዊ ንጥፈታት ኮነ ካብ ምንቅስቃሳት ትራፊክውን ክትቁጠብ ይከኣል። መኪና ምዝዋርውን ተኸነ ቅድሚ 12 ሰዓታት ኣይፍቀድን እዩ። ድሕሪ ሕክምና ብቀጥታ ካብ ክሊኒክ ናብ ገዛኻ ኣብ ትኸይሉ ጊዜውን ብመሰነይታ ሓጋዚ (ሌድሶጋረ) ኢኻ ክትከይድ ዘሎካ።

ሓበሬታ ንኣለይቲ

ኣብ እዋን ሕክምና ክትሓስቦም ዘሎካ

ሓደ ሓደ ግዜ ቆልዑ ብምክንያት መድሃኒት ክሓርቁን ክሓዝኩን ስለዝኸእሉ፡ ክንእብዶምን ክነጸናንዎምን ኣሎና። ብድሕሪ'ዚ ንስኻ ነቲ ቆልዓ ኣወንታዊ ሰእሊ ናይቲ ዝተኸየደ ሕክምና ክትህቦ ኣሎካ፡ መታን ነቲ ቆልዓ ዝኸረ ክኾና።

ድሕረ ሕክምና ክትሓስበም ዘሎካ

ብመኪና ናብ ገዛኹም ክትጓዙ ከለኹም እቲ ቆልዓ ከም ልሙድ ኣብ መኸፈሊኡ ብቁልፊ ተዓጢቁ ኮፍ ክብልን ኣብ ጎኑ ዓቢ ሰብ ክህሉ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ገዛ ምስቲ ቆልዓ ፍኹስ ኢልኩም ዋዓሉ፡ ሚዛኑ ከየሸግሮ ብግብኡ ኣቀምጥዎ፡ እንተድኣ ክድቅስ ደልዩ ካኣ ብጎኑ ኣደቅስዎ።

ንሕክምና ሚዳዘላም ክንደይ ይኸፈሉ?

እዚ ዓይነት ሕክምና ኣብ ክሊኒክ ተወሳኺ ጊዜ ዘድልዮ እዩ። እዚ ሕክምና ብመሰረት ሕጊ ሕክምና ቆልዑን መንእሰያትን ስኒ ብነጻ እዩ ዝዋሃብ። ንዓበይቲ ግና ቦቲ ዘሎ እዋናዊ ዋጋ እዩም ከፊሎም ዝሕከሙ።

ነቶም ድንጉዮም ከምዘይመጹ ዝሕብሩን ምኽፋል ዝድንጉዩን ዓበይቲ ኮኑ ቆልዑ ድማ ዝላዓለ ናይ ክፍሊት መቅጸዕቲ ክኸፍሉ ይግደዱ።

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

Information till vårdnadshavare

Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg.

Att tänka på efter behandling

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.